

2026/1410

17.7.2026

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/1410 DE LA COMISIÓN**de 26 de junio de 2026****por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion» de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas ⁽¹⁾, y en particular su artículo 44, apartado 5, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

- (1) El 27 de junio de 2016, Schuelke & Mayr GmbH presentó a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la Agencia»), de conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 528/2012 y con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 414/2013 de la Comisión ⁽²⁾, una solicitud de autorización de la Unión para la misma familia de biocidas, según se establece en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 414/2013 de la Comisión, denominada «Prisman Händedesinfektion», del tipo de producto 1 según se describe en el anexo V del Reglamento (UE) n.º 528/2012. La solicitud se registró con el número de caso BC-QG025240-55 en el Registro de Biocidas. La solicitud hacía referencia a la familia de biocidas «desmanol pure», autorizada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1905 de la Comisión ⁽³⁾, con número de autorización EU-0033833-0000.
- (2) La familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion» contiene como sustancia activa propan-2-ol, que figura en la lista de la Unión de sustancias activas aprobadas contemplada en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 528/2012 para el tipo de producto 1.
- (3) El 24 de febrero de 2025, la Agencia presentó a la Comisión su dictamen ⁽⁴⁾ y el proyecto de resumen de las características del producto («el resumen») de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 414/2013.
- (4) En su dictamen, la Agencia concluyó que las diferencias propuestas entre la familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion» y la familia de biocidas de referencia afín «desmanol pure» se limitan a información que puede estar sujeta a cambios administrativos de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión ⁽⁵⁾ y que, sobre la base de la evaluación de la familia de biocidas de referencia afín «desmanol pure» y siempre que sea conforme con el proyecto de resumen, la misma familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion» cumple las condiciones establecidas en el artículo 19, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 528/2012.

⁽¹⁾ DO L 167 de 27.6.2012, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 414/2013 de la Comisión, de 6 de mayo de 2013, por el que se especifica un procedimiento para la autorización de unos mismos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 125 de 7.5.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

⁽³⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1905 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2025, por el que se concede una autorización de la Unión respecto a la familia de biocidas «desmanol pure» de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2025/1905, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

⁽⁴⁾ Dictamen de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 24 de febrero de 2025, sobre la autorización de la Unión de la misma familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion», UBP-C-1804198-07-00/F, <https://echa.europa.eu/es/opinions-on-applications-for-union-authorisation>.

⁽⁵⁾ Reglamento de Ejecución (UE) n.º 354/2013 de la Comisión, de 18 de abril de 2013, relativo a cambios de biocidas autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 109 de 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

- (5) El 13 de noviembre de 2025, la Agencia envió a la Comisión el resumen revisado de las características de la familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion» en todas las lenguas oficiales de la Unión, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 528/2012.
- (6) La Comisión está de acuerdo con el dictamen de la Agencia y, por tanto, considera adecuado conceder una autorización de la Unión para la misma familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion».
- (7) La fecha de expiración de esta autorización debe ajustarse a la fecha de expiración de la autorización de la familia de biocidas de referencia afín «desmanol pure».
- (8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se concede una autorización de la Unión con el número EU-0034420-0000, a Schuelke & Mayr GmbH para la comercialización y el uso de la misma familia de biocidas «Prisman Händedesinfektion», de conformidad con el resumen de las características del producto que figura en el anexo.

La autorización de la Unión será válida desde el 6 de agosto de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2035.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 26 de junio de 2026.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DE BIOCIDAS

Prisman Händedesinfektion

Tipo(s) de producto

PT01: Higiene humana

Número de autorización EU-0034420-0000**Número de referencia R4BP** EU-0034420-0000

PARTE I.

PRIMER NIVEL DE INFORMACIÓN

Capítulo 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Nombre de familia**

Nombre	Prisman Händedesinfektion
--------	---------------------------

1.2. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

1.3. **Titular de la autorización**

Razón social y dirección del titular de la autorización	Nombre	Schuelke & Mayr GmbH
	Dirección	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Número de autorización	EU-0034420-0000	
Número de referencia R4BP	EU-0034420-0000	
Fecha de la autorización	6 de agosto 2026	
Fecha de vencimiento de la autorización	30 de septiembre 2035	

1.4. **Fabricante(s) del producto**

Nombre del fabricante	Prisman Chemie GmbH
Dirección del fabricante	Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	Prisman Chemie GmbH site 1 Otto-Hahn-Ring 6-18 64653 Lorsch Alemania

1.5. **Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)**

Sustancia activa	Propan-2-ol
Nombre del fabricante	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Dirección del fabricante	Am Stadtholz 37 33609 Bielefeld Alemania
Ubicación de las plantas de fabricación	INEOS Solvents Germany GmbH Römerstraße 7 33 47443 Moers Alemania

Capítulo 2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición de la familia

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

PARTE II.

SEGUNDO NIVEL DE INFORMACIÓN META-RCP(S)

Capítulo 1. META-RCP 1 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 1 identificador

Identificador	meta SPC1
---------------	-----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-1
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 1

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 1

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 1

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 1 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para su uso para la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.2. **Descripción de uso**

Tabla 2.

Uso nº 2 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 3 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero

	Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear 5 ml (en la cuenca de la mano) en la palma de la mano (2-4 pulsaciones). Frotar las manos y los antebrazos durante al menos 45 segundos. Repetir el proceso de verter y frotar el producto una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación/recarga del producto biocida para desinfección quirúrgica de manos sólo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 4 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias

	Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 5 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)

Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 6 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.6.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.6.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.6.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.7. **Descripción de uso**

Tabla 7.

Uso nº 7 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	no relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 7.1.: (profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 7.2.: (profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 7.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 7.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 7.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 7.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra la actividad viricida de espectro limitado): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) (2-4 pulsaciones) del producto en la palma o bien bombear 5 ml (en la cuenca de la mano) en la palma. Frotar las manos y los antebrazos durante al menos 45 segundos. Repetir el proceso de verter y frotar el producto una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 8 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 8.1.: (Profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias, como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos y salas pediátricas), consultorios médicos o dentales, estudios de cosmética, atención a personas mayores y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 8.2.: (Profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 8.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 8.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 8.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 8.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra la actividad viricida de espectro limitado): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 9 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional – bacterias, levaduras – verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales;

	Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 10 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 10.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 10.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 10.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 10.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 10.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 10.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra la actividad viricida de espectro limitado): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.10.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

- 4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

- 4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 1

5.1. Instrucciones de uso

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

- 5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/ sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota “Categoría(s) de usuarios”: Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 1

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 21			
Número de autorización			EU-0034420-0001 1-1			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 2 identificador

Identificador	meta SPC2
---------------	-----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-2
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 2

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 2

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 2

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 2

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 11 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 12 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear (1-2 pulsaciones) en la palma de la mano. Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 13 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 14 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 15 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 16 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: según sea necesario (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.7. **Descripción de uso**

Tabla 7.

Uso nº 17 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Descripción del campo de uso: #Uso nº 17.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidad de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) o en áreas industriales, por ejemplo, industria farmacéutica o de producción de alimentos #Uso nº 17.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, etc.), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: #Uso nº 17.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) #Uso nº 17.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso nº 17.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso nº 17.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.7.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.7.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.7.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.7.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.8. **Descripción de uso**

Tabla 8.

Uso nº 18 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 18.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 18.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 18.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 18.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso nº 18.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso nº 18.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.8.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.8.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.8.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.8.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.9. **Descripción de uso**

Tabla 9.

Uso nº 19 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional – bacterias, levaduras – verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), tambor (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.10. **Descripción de uso**

Tabla 10.

Uso nº 20 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 20.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 20.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 20.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 20.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 20.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 20.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.10.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.10.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.10.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.10.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.11. Descripción de uso

Tabla 11.

Uso nº 21 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (como en casos especiales, por ejemplo, conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.11.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.11.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.11.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.11.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.11.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.12. Descripción de uso

Tabla 12.

Uso nº 22 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.12.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;

- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.12.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.12.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.12.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.12.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril(HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.13. Descripción de uso

Tabla 13.

Uso nº 23 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.13.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.13.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.13.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.13.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.13.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.14. Descripción de uso

Tabla 14.

Uso nº 24 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.14.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.14.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.14.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.14.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.14.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 2

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:**

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:**Información general**

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 2

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 22			
Número de autorización			EU-0034420-0002 1-2			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 3 identificador

Identificador	meta SPC3
---------------	-----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-3
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 3

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 3

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 3

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 3

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 25 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.2. **Descripción de uso**

Tabla 2.

Uso nº 26 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)

Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.2.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.2.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.2.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.2.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.3. **Descripción de uso**

Tabla 3.

Uso nº 27 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para su uso para la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/ unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), tambor (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 28 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 29 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

- 4.5.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

- 4.5.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

- 4.5.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

- 4.6. **Descripción de uso**

Tabla 6.

Uso nº 30 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: según sea necesario (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 31 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 31.1.: (profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 31.2.: (profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 31.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 31.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 31.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 31.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE

	Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.8. **Descripción de uso**

Tabla 8.

Uso nº 32 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapas de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 32.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 32.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 32.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 32.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total)

	Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso n° 32.1: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso n° 32.2: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;

- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.8.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.8.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.8.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.8.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.9. **Descripción de uso**

Tabla 9.

Uso nº 33 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 34 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 34.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética). Uso nº 34.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 34.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 34.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 34.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 34.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.10.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

- 4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

- 4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 3

5.1. Instrucciones de uso

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 3

7.1. **Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 23			
Número de autorización			EU-0034420-0003 1-3			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 4 identificador**

Identificador	meta SPC4
---------------	-----------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-4
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 4

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 4**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 4**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 4

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
-------------------------	--

Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.
-----------------------	---

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 35 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en el ámbito privado/sanitario en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 36 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 37 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), tambor (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 38 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.4.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.4.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.4.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.4.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.5. **Descripción de uso**

Tabla 5.

Uso nº 39 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)

Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.6. **Descripción de uso**

Tabla 6.

Uso nº 40 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 41 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 41.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 41.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 41.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 41.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso nº 41.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso nº 41.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 42 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 42.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 42.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 42.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 42.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 42.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 42.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 43 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE

	Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 44 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 44.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 44.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 44.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 44.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 44.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 44.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.10.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.10.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.10.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.10.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.11. Descripción de uso

Tabla 11.

Uso nº 45 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo, en caso de enfermedades/caso especial: conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.11.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.11.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.11.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.11.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.12. **Descripción de uso**

Tabla 12.

Uso nº 46 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.12.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.12.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.12.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.12.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.12.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.13. Descripción de uso

Tabla 13.

Uso nº 47 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada:
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.13.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.13.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.13.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.13.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.14. Descripción de uso

Tabla 14.

Uso nº 48 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en el ámbito privado/sanitario en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades/caso especial: conjuntivitis).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.14.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.14.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.14.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.14.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.14.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 4

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 4**7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 24			
Número de autorización			EU-0034420-0004 1-4			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 5 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 5 identificador**

Identificador	meta SPC5
---------------	-----------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-5
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 5

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 5**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 5**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 5

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

	P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.
--	---

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 49 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 50 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE

	Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 51 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE

	Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 52 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 53 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 54 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE): 36 meses

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 55 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 55.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 55.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 55.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 55.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 55.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 55.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 56 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 56.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 56.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 56.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 56.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 56.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 56.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfectante quirúrgico para manos:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.8.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.8.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.8.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.8.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.9. **Descripción de uso**

Tabla 9.

Uso n° 57 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional – bacterias, levaduras, hongos – verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Bactericida, levuricida, fungicida: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 58 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional – bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 58.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 58.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 58.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 58.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 58.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 58.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfectante quirúrgico para manos:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.10.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (HDPE), bidón (HDPE), barril (HDPE), IBC (HDPE con marco de acero): 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 5

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 5

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)	Händedesinfektion	
	Hand Disinfection	
	Désinfection Des Mains	
	Rankos Dezinfekuoamos	
	Disinfezione Delle Mani	
	Roku Dezinfekcija	
	Käte Desinfektsioon	
	Dezynfekcja Rąk	
	Dezinfectarea Mâinilor	
	дезинфекция на ръцете	
	Hånddesinfektion	
	Käsidesinfektio	
	αντισηψία των χεριών	
	Dezinfekciju Ruku	
	Rankų Dezinfekcija	
	Handdesinfektion	
	Dezinfekcia Rúk	

	Desinfección De Las Manos	
	Dezinfekce Rukou	
	Kézfertőtlenítés	
	PRISMAN Händedesinfektion	
	PRISMAN Hand Disinfection	
	PRISMAN Désinfection Des Mains	
	PRISMAN Rankos Dezinfekuojamos	
	PRISMAN Disinfezione Delle Mani	
	PRISMAN Roku Dezinfekcija	
	PRISMAN Käte Desinfektsioon	
	PRISMAN Dezynfekcja Rąk	
	PRISMAN Dezinfectarea Măinilor	
	PRISMAN дезинфекция на ръцете	
	PRISMAN Hånddesinfektion	
	PRISMAN Käsidesinfektio	
	PRISMAN αντισηψία των χεριών	
	PRISMAN Dezinfekciju Ruku	
	PRISMAN Rankų Dezinfekcija	

	PRISMAN Handdesinfektion	
	PRISMAN Dezinfekcia Rúk	
	PRISMAN Desinfección De Las Manos	
	PRISMAN Dezinfekce Rukou	
	PRISMAN Kézfertőtlenítés	
	Innocid Händedesinfektion HD-i50	
	Innocid HD-i50 Hand Disinfection	
	Innocid HD-i50 Désinfection Des Mains	
	Innocid HD-i50 Rankos Dezinfekuoamos	
	Innocid HD-i50 Disinfezione Delle Mani	
	Innocid HD-i50 Roku Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Käte Desinfektsioon	
	Innocid HD-i50 Dezynfekcja Rąk	
	Innocid HD-i50 Dezinfectarea Măinilor	
	Innocid HD-i50 дезинфекция на ръцете	
	Innocid HD-i50 Hånddesinfektion	
	Innocid HD-i50 Käsidesinfektio	

	Innocid HD-i50 αντισηψία των χεριών	
	Innocid HD-i50 Dezinfekciju Ruku	
	Innocid HD-i50 Rankų Dezinfekcija	
	Innocid HD-i50 Handdesinfektion	
	Innocid HD-i50 Dezinfekcia Rúk	
	Innocid HD-i50 Desinfección De Las Manos	
	Innocid HD-i50 Dezinfekce Rukou	
	Innocid HD-i50 Kézfertőtlenítés	
	SunSept Händedesinfektion	
	SunSept Hand Disinfection	
	• SunSept Désinfection Des Mains	
	SunSept Rankos Dezinfekuojamos	
	SunSept Disinfezione Delle Mani	
	SunSept Roku Dezinfekcija	
	SunSept Käte Desinfektsioon	
	SunSept Dezynfekcja Rąk	
	SunSept Dezinfectarea Mâinilor	

	SunSept дезинфекция на ръцете				
	SunSept Hånddesinfektion				
	SunSept Käsidesinfektio				
	SunSept αντισηψία των χεριών				
	SunSept Dezinfekciju Ruku				
	SunSept Rankų Dezinfekcija				
	SunSept Handdesinfektion				
	SunSept Dezinfekcia Rúk				
	SunSept Desinfección De Las Manos				
	SunSept Dezinfekce Rukou				
	SunSept Kézfertőtlenítés				
Número de autorización		EU-0034420-0005 1-5			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/ m)

Capítulo 1. META-RCP 6 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 6 identificador

Identificador	meta SPC6
---------------	-----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-6
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 6

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 6

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 6

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 6

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. EUH208: Contiene Isoeugenol. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 59 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 5 ml por desinfección, correspondientes a 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)
--	---

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano. Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 60 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan húmedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.2.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.2.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.2.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.2.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

4.3. **Descripción de uso**

Tabla 3.

Uso nº 61 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 61.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 61.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 61.1.: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 5 ml por desinfección, correspondientes a 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 61.2.: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 61.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 61.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfectante quirúrgico para manos: Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;

- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 62 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)
--	--

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 6

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 6**7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)			HD1			
Número de autorización			EU-0034420-0006 1-6			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 7 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 7 identificador**

Identificador	meta SPC7
---------------	-----------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-7
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 7

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 7**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 7**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 7

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave.

	P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.
--	---

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 63 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 5 ml por desinfección, correspondientes a 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales

	Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)
--	---

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano. Frotar durante al menos 30 segundos.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 64 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 65 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 65.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 65.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 65.1.: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 5 ml por desinfección, correspondientes a 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 65.2.: Contra bacterias, levaduras, bacterias de la tuberculosis y virus envueltos: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 65.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 65.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfectante quirúrgico para manos: Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

Bidón de 5-30 l, barril de 220 l, contenedor de 1 000 l: Rellenar o transferir a otros envases/dispositivos según sea necesario.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

Todos los materiales deben ser totalmente compatibles con el producto. El dispensador o envase que se rellene debe tener la siguiente información mínima en el etiquetado:

- El número de autorización;
- El nombre comercial del producto biocida;
- La identidad y el contenido de cada sustancia activa;
- Las instrucciones de uso, incluido el tiempo de incorporación necesario para la acción biocida;
- La información según el reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado).

4.3.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.3.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.3.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.3.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Proteger de la luz solar directa.
Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.
Vida útil: 36 meses

4.4. **Descripción de uso**

Tabla 4.

Uso nº 66 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear – interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 125, 500 1 000 ml Envase: HDPE Cierre: Tapón tipo clack: PP o Dispositivo de bombeo: sistema complejo (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, acero inoxidable) Bidón: 5, 10, 20, 30 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Barril: 220 l Envase: HDPE Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales IBC: 1 000 l Envase: HDPE con marco de acero Cierre: HDPE, LDPE, PP o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), LDPE, PE-LD (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno)

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 30 segundos. Repetir este paso una vez más.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.4.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: 36 meses

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 7

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 7

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			HD2			
Número de autorización			EU-0034420-0007 1-7			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,14 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 8 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 8 identificador

Identificador	meta SPC8
---------------	-----------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-8
--------	-----

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 8

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 8

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 8

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 8

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
-------------------------	--

Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.
-----------------------	--

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 67 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil: Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 68 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.2.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

4.2.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.2.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.2.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.2.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.3. **Descripción de uso**

Tabla 3.

Uso n° 69 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear 5 ml (en la cuenca de la mano) en la palma (2-4 pulsaciones). Frotar las manos y los antebrazos durante al menos 45 segundos. Repetir el proceso de verter y frotar el producto una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 70 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 71 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

- 4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 72 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: según sea necesario (normalmente 3 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 73 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 73.1.: (profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 73.2.: (profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 73.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 73.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Frecuencia: Uso nº 73.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 73.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 73.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 73.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear 3 ml (un puñado) en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) (2-4 pulsaciones) del producto en la palma o bien bombear 5 ml (en la cuenca de la mano) en la palma. Frotar las manos y los antebrazos durante al menos 45 segundos. Repetir el proceso de verter y frotar el producto una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 74 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 74.1.: (Profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias, como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos y salas pediátricas), consultorios médicos o dentales, estudios de cosmética, atención a personas mayores y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 74.2.: (Profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 74.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 74.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 74.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 74.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 75 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.9.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.9.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.9.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.9.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.10. **Descripción de uso**

Tabla 10.

Uso nº 76 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 76.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 76.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: ---
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 76.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 76.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 76.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 76.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear el producto en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 8

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. **Medidas de mitigación de riesgos**

5.3. **Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. **Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase**

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. **Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 8

7.1. **Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 21		
Número de autorización			EU-0034420-0008 1-8		
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-RCP 9 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 9 identificador**

Identificador	meta SPC9
---------------	-----------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-9
--------	-----

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 9

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 9**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 9

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 9

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 77 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas

	Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.1.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.1.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.2. **Descripción de uso**

Tabla 2.

Uso nº 78 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 79 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.3.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.3.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.3.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.4. **Descripción de uso**

Tabla 4.

Uso n° 80 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 81 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 82 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas

	Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: según sea necesario (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.6.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.6.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.7. **Descripción de uso**

Tabla 7.

Uso nº 83 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores #Uso nº 83.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidad de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) o en áreas industriales, por ejemplo, industria farmacéutica o de producción de alimentos #Uso nº 83.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias como hospitales (incluidas UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, etc.), consultorios médicos o dentales
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: #Uso n° 83.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) #Uso n° 83.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso n° 83.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso n° 83.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos: Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma de la mano (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento: Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir ese paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

- 4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 84 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 84.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 84.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso n° 84.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso n° 84.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso n° 84.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso n° 84.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear en la palma (2-4 pulsaciones) y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.8.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

--

4.8.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.8.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.8.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.9. **Descripción de uso**

Tabla 9.

Uso nº 85 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 86 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 86.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 86.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 86.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 86.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 86.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 86.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos):

Poner 3 ml del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones). Frotar durante al menos 30 segundos. Para lograr una mayor actividad micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.10.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.10.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.10.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.10.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.11. Descripción de uso

Tabla 11.

Uso nº 87 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (como en casos especiales, por ejemplo, conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.11.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.11.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.11.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.11.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.11.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.12. **Descripción de uso**

Tabla 12.

Uso nº 88 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.12.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

4.12.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.12.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.12.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.12.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.13. Descripción de uso

Tabla 13.

Uso nº 89 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.13.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.13.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.13.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.13.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.13.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.14. Descripción de uso

Tabla 14.

Uso nº 90 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.14.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

4.14.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.14.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.14.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.14.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 9

5.1. Instrucciones de uso

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 9

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 22		
Número de autorización			EU-0034420-0009 1-9		
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Principio no activo	112-72-1	204-000-3	0,5 % (m/m)

Capítulo 1. META-RCP 10 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. **Meta-RCP 10 identificador**

Identificador	meta SPC10
---------------	------------

1.2. **Sufijo del número de autorización**

Número	1-10
--------	------

1.3. **Tipo(s) de producto**

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 10

2.1. **Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 10**

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. **Tipo(s) de formulación del meta-RCP 10**

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 10

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

	P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.
--	---

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 91 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Producto listo para su uso para la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 92 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso n° 93 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y actividad viricida de espectro limitado: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 94 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.4.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

4.4.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.4.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.4.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.4.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.5. **Descripción de uso**

Tabla 5.

Uso nº 95 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.6. **Descripción de uso**

Tabla 6.

Uso nº 96 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos): Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 97 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas

	Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapas de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 97.1.: (profesional, industrial): Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 97.2.: (profesional): Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 97.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 97.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 97.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 97.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE

	Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 98 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 98.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 98.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 98.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso nº 98.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 98.1: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 98.2: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegúrese de que sus manos y antebrazos se mantienen húmedos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 99 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.9.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.9.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.9.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.9.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.10. Descripción de uso

Tabla 10.

Uso nº 100 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso n° 100.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética). Uso n° 100.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso n° 100.1.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Uso n° 100.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos y virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso n° 100.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso n° 100.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (incluye actividad contra virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos.

Desinfección quirúrgica de manos (incluye actividad contra virus (actividad viricida de espectro limitado)): Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 10

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:

Información general

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 10**7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual**

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 23			
Número de autorización			EU-0034420-0010 1-10			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 11 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA**1.1. Meta-RCP 11 identificador**

Identificador	meta SPC11
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-11
--------	------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 11

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 11

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 11

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 11

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso nº 101 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en el ámbito privado/sanitario en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades).
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 102 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

4.2.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.2.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.2.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.2.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.3. **Descripción de uso**

Tabla 3.

Uso nº 103 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -

Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.4. Descripción de uso

Tabla 4.

Uso nº 104 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso n° 105 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

- 4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- 4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

- 4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 106 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 107 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 107.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 107.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 107.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 107.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: #Uso nº 107.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) #Uso nº 107.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 108 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 108.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales, por ejemplo la industria farmacéutica o de producción de alimentos Uso nº 108.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 108.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 108.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 108.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 108.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (Eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 109 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra bacterias y levaduras: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.9.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.9.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.9.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.9.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.10. **Descripción de uso**

Tabla 10.

Uso nº 110 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, micobacterias, virus envueltos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Micobacterias Nombre común: Micobacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 110.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 110.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)

Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 110.1.: Contra bacterias, levaduras y virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Contra micobacterias: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,9 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 110.2.: Contra bacterias, levaduras, micobacterias y virus envueltos: 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 90 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 110.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 110.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras y virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener mayor eficacia micobactericida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 45 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.11. **Descripción de uso**

Tabla 11.

Uso nº 111 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo, en caso de enfermedades/caso especial: conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.11.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.11.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.11.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.11.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.11.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.12. Descripción de uso

Tabla 12.

Uso nº 112 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.12.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.12.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.12.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.12.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

--

4.12.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.13. Descripción de uso

Tabla 13.

Uso nº 113 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para su uso para la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias como consultas médicas (solo en casos especiales, como por ejemplo conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional

Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	---

4.1.3.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

4.1.3.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.1.3.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.3.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.3.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.14. Descripción de uso

Tabla 14.

Uso nº 114 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo, en caso de enfermedades/caso especial: conjuntivitis)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Contra virus (actividad viricida de espectro limitado): 2 x 5 ml por desinfección, correspondientes a 2 x 3,16 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 120 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.14.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma de la mano o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos. Frotar durante al menos 60 segundos. Repetir este paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.14.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

Evitar la desinfección con el producto en presencia de niños menores de 6 años.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.14.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.14.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.14.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 11

5.1. Instrucciones de uso

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:**

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:**Información general**

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y fríéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 11

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 24			
Número de autorización			EU-0034420-0011 1-11			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	75 % (m/m)	

Capítulo 1. META-RCP 12 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

1.1. Meta-RCP 12 identificador

Identificador	meta SPC12
---------------	------------

1.2. Sufijo del número de autorización

Número	1-12
--------	------

1.3. Tipo(s) de producto

Tipo(s) de producto	PT01: Higiene humana
---------------------	----------------------

Capítulo 2. COMPOSICIÓN META RCB 12

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta-RCP 12

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulación del meta-RCP 12

Tipo(s) de formulación	AL Cualquier otro líquido
------------------------	---------------------------

Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA DEL META-RCP 12

Indicaciones de peligro	H225: Líquido y vapores muy inflamables. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P261: Evitar respirar el aerosol. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. P312: Llamar a un médico si la persona se encuentra mal. P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P405: Guardar bajo llave. P501: Eliminar contenido en de conformidad con las normativas local y nacional. P501: Eliminar recipiente en de conformidad con las normativas local y nacional.

Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S) DEL META-RCP

4.1. Descripción de uso

Tabla 1.

Uso n° 115 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos:

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.1.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.1.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.1.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.2. Descripción de uso

Tabla 2.

Uso nº 116 Desinfectante higiénico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.2.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

4.2.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.2.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.2.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.2.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.3. Descripción de uso

Tabla 3.

Uso nº 117 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.3.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.3.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.3.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.3.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.3.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.4. **Descripción de uso**

Tabla 4.

Uso nº 118 Desinfectante higiénico de manos - usuario industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas industriales, por ejemplo, la industria farmacéutica o de producción de alimentos
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 25 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.4.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos: Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

4.4.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.4.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.4.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.4.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.5. Descripción de uso

Tabla 5.

Uso nº 119 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapas de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapas de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapas de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas privadas/asistencia sanitaria en áreas domésticas (por ejemplo en caso de enfermedades)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se requiera (normalmente 3 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.5.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bombear en la palma de la mano (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.5.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante y después de la aplicación del producto. Abra las ventanas o encienda la ventilación mecánica en la zona del baño o la cocina.

No utilizar cerca de animales domésticos.

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

Su uso está restringido a adultos.

4.5.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.5.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.5.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

4.6. Descripción de uso

Tabla 6.

Uso nº 120 Desinfectante higiénico de manos - usuario no profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 3 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	público en general (no profesional)
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.6.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos:

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

El producto está restringido al uso exclusivo en adultos.

4.6.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

En caso de sequedad de la piel, utilizar una loción adecuada para el cuidado de la piel.

4.6.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.6.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.6.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE) y bolsa/sobre (PE): 6 días

4.7. Descripción de uso

Tabla 7.

Uso nº 121 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 121.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 121.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 121.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 121.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 121.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 121.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales

	bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)
--	--

4.7.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos:

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfección quirúrgica de manos mediante frotamiento:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma de la mano y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.7.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.7.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.7.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.7.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.8. Descripción de uso

Tabla 8.

Uso nº 122 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional, industrial - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 122.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) y en áreas industriales como la industria farmacéutica o de producción de alimentos. Uso nº 122.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 122.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 122.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 122.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 122.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)

Categoría(s) de usuarios	industrial profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.8.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfectante quirúrgico para manos:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.8.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

4.8.3. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

4.8.4. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

4.8.5. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.9. Descripción de uso

Tabla 9.

Uso nº 123 Desinfectante quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas
Ámbito(s) de uso	uso en interiores Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Bactericida, levuricida, fungicida: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Según se necesite (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.9.1. *Instrucciones de uso para el uso específico*

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secar las manos antes de usar el producto.

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.9.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.9.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.9.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.9.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

4.10. **Descripción de uso**

Tabla 10.

Uso nº 124 Desinfectante higiénico/quirúrgico de manos - usuario profesional - bacterias, levaduras, hongos, bacterias de la tuberculosis, virus envueltos, virus (actividad viricida de espectro limitado) - verter o bombear - interior

Tipo de producto	PT01: Higiene humana
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	No relevante
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Bacterias Nombre común: Bacterias Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Levaduras Nombre común: Levaduras Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Hongos Nombre común: Hongos Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Bacterias de la tuberculosis Nombre común: Bacterias de la tuberculosis Etapa de desarrollo: células vegetativas Nombre científico: Virus envueltos Nombre común: Virus envueltos Etapa de desarrollo: no aplicable Nombre científico: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Nombre común: Virus (actividad viricida de espectro limitado) Etapa de desarrollo: no aplicable

Ámbito(s) de uso	uso en interiores Uso nº 124.1.: Producto listo para usar en la desinfección higiénica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos, atención a personas mayores, estudios de cosmética) Uso nº 124.2.: Producto listo para usar en la desinfección quirúrgica de manos en áreas sanitarias (por ejemplo, hospitales, UCI/unidades de cuidados intensivos, salas pediátricas, consultorios médicos)
Método(s) de aplicación	Método: Verter o bombear (especificación del dispensador: bomba de goteo/salida: goteo) Descripción detallada: -
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Uso nº 124.1.: Actividad bactericida, levuricida y viricida contra virus envueltos: 3 ml por desinfección, correspondiente a 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 30 segundos Actividad viricida de espectro limitado, eficacia fungicida y tuberculocida: 2 x 3 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 1,65 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 60 segundos (en total) Uso nº 124.2.: 2 x 5 ml por desinfección, correspondiente a 2 x 2,76 g de sustancia activa Tiempo de contacto: 180 segundos (en total) Número y frecuencia de aplicación: Frecuencia: Uso nº 124.1.: según sea necesario (normalmente 25 aplicaciones al día) Uso nº 124.2.: según sea necesario (normalmente 4 aplicaciones al día)
Categoría(s) de usuarios	profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Botella: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales bolsa/sobre: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Envase: PET/ALU/PE, PET/PE o PET-SiO/PE Cierre: PP, PC, PE, HDPE, LDPE o una combinación de estos materiales; Dispositivo de bombeo: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, acero inoxidable, silicona, gel de sílice, NBR, TPE, vidrio o una combinación de estos materiales Abreviaturas: HDPE (polietileno de alta densidad), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PE (polietileno), LDPE (polietileno de baja densidad), EVA (etilvinilacetato), POM (polioximetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PET (tereftalato de polietileno), NBR (caucho de nitrilo butadieno), TPE (elastómero termoplástico), ALU (aluminio)

4.10.1. Instrucciones de uso para el uso específico

El producto está listo para su uso. Aplicar el producto únicamente sobre la superficie de la piel humana intacta. Lavar y secarse las manos antes de usar el producto.

Desinfectante higiénico de manos (eficacia contra bacterias, levaduras, virus envueltos):

Poner 3 ml (un puñado) del producto en la palma de la mano o bien bombear en la palma (1-2 pulsaciones) y frotar las manos. Frotar durante al menos 30 segundos. Para obtener una actividad viricida de espectro limitado adicional y una eficacia fungicida y tuberculocida, repetir ese paso una vez más.

Desinfectante quirúrgico para manos:

Poner 5 ml (en la cuenca de la mano) del producto en la palma o bien bombear (2-4 pulsaciones) en la palma y frotar las manos y los antebrazos. Frotar durante al menos 90 segundos. Repetir este paso una vez más. Asegurarse de que las manos y los antebrazos se mantengan humedecidos por el producto durante todo el tiempo de aplicación.

La decantación o recarga del producto biocida para su uso en la desinfección quirúrgica de manos solo debe realizarse en condiciones asépticas.

4.10.2. *Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico*

4.10.3. *Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente*

4.10.4. *Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase*

4.10.5. *Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento*

Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Proteger de la luz solar directa.

Almacenar a temperatura ambiente en el envase original.

Vida útil:

Botella (PE), bolsa/sobre (PE): 6 días

Capítulo 5. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL USO DEL META-RCP 12

5.1. **Instrucciones de uso**

Técnica de aplicación:

Paso 1: Aplicar el desinfectante y frotarlo en la palma de la mano. Frotar palma con palma para esparcir el desinfectante por las manos y los dedos.

Paso 2: Frotar el dorso de la mano izquierda con la palma de la mano derecha. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 3: Abrir los dedos y frotar las membranas entre los dedos. Invertir el proceso y repetir la acción.

Paso 4: Frotar palma con palma con los dedos entrelazados (5 veces).

Paso 5: Frotar el pulgar de cada mano haciendo un movimiento rotatorio.

Paso 6: Frotar las puntas de los dedos contra la palma de la mano opuesta haciendo un movimiento circular. Frotar la muñeca con ambas manos. Dejar que las manos se sequen por completo.

No utilizar el producto junto con otros productos.

Lea siempre la etiqueta o el prospecto antes de utilizar el producto y siga todas las instrucciones proporcionadas.

Manténgase fuera del alcance de niños y animales no objetivo/ mascotas

Evitar el contacto con los ojos.

No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Asegúrese de que el producto aplicado esté completamente seco antes de entrar a una habitación o área donde las personas permanecerán durante un período de tiempo prolongado.

5.2. Medidas de mitigación de riesgos

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**Detalles de los posibles efectos directos o indirectos:**

Ninguno.

Instrucciones de primeros auxilios:**Información general**

Llevar a la persona a un lugar seguro. Adoptar medidas de autoprotección para primeros auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparecen síntomas.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Si se produce irritación, lave con agua y busque atención médica. En casos de exposición cutánea no intencionada: lavar con agua.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítense las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INHALACIÓN: Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.

Si hay síntomas: Llame al 112 / ambulancia para asistencia médica.

Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Información para el personal sanitario/médico: Si es necesario, inicie medidas de soporte vital y, a continuación, llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Los vapores tienen un efecto narcótico y pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Tos. Dificultad para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

Evitar el vertido de concentrados al suelo, aguas superficiales o subterráneas, por ejemplo, a través de recipientes de recogida.

Recoger el producto derramado utilizando un material adecuado (por ejemplo, tierra, arena, tierra de diatomeas, vermiculita, agentes aglutinantes universales).

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

En caso de contaminación del suelo o de masas de agua, informe a las autoridades competentes.

Tener cuidado con el peligro de explosión.

Los vapores son más pesados que el aire, se esparcirán por el suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillado, sótanos, depósitos).

Utilizar herramientas que no produzcan chispas y equipos a prueba de explosiones.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Garantizar la continuidad eléctrica conectando y poniendo a tierra todos los equipos.

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especial de acuerdo con las normativas local/nacional/internacional.

Los residuos del producto deben recogerse y eliminarse de acuerdo con la legislación nacional sobre eliminación de residuos y las normativas local y/o regional de las autoridades.

Evite el vertido (directo) (del producto sin diluir) en el medio ambiente/sistema de alcantarillado.

No vacíe el producto por el desagüe.

Diluya el líquido derramado con agua y friéguelo.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Recomendación para uso profesional:

P280 Llevar protección para los ojos

Tener en cuenta el valor de referencia europeo de 129,2 mg/m³ para la sustancia activa propan-2-ol (N.º CAS: 67-63-0) que se utilizó para la evaluación de riesgos de la familia de productos biocidas.

Respecto a la nota "Categoría(s) de usuarios": Por profesionales (incluidos los usuarios industriales) se entiende a profesionales formados si así lo exige la legislación nacional.

Capítulo 7. TERCER NIVEL DE INFORMACIÓN: PRODUCTOS INDIVIDUALES EN EL META-RCP 12

7.1. Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre(s) comercial(es)			Schülke® 25			
Número de autorización			EU-0034420-0012 1-12			
Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)	
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	63,1 % (m/m)	